

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

APEL

[Pobierz plik w formacie PDF](#)



APEL

do hodowców trzody chlewniej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, nie jest
szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone zwierzęta. Często
bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach bioasekury.


Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH N GOSPODARSTWA PI ŚWIŃ (ASF)



Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski
niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

[illegible]

7 - propozycja częstotliwości dokonywania przeglądu - co najmniej 1/2 tygodnia oraz dalszanie w przypadku uderzeń mogących przyczynić się do utraty szczelności budowlanych

5 / 19

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

[Rejestr wojów do budowy kościoła zimywanina świni](#)

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

8 / 19

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

[Pobierz plik w formacie Worda](#)




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kr
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnej
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących świnię, w tym o konieczności

1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW ZWIERZĄT

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja pojazdów, dezynfekcja kabiny)




2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ OBUWIA



3. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO

(czyszczenie na sucho, mokro, dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach, w których
bioasekuracja granic gospodarstwa oraz dotycząca personelu),



Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

DOSTĘPNE PRODUKTY BIOBÓJCZE DO STOSOWANIA W CELU NISZCZENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). STAN NA DZIEŃ: 9 MARCA 2018

AGRISAN 8090

- **POSTAĆ:** proszek przeznaczony do utrzymania higieny w miejscach hodowli i przetwarzania zwierząt oraz do dezynfekcji budynków inwentarskich;
- **OPAKOWANIE:** worek papierowy/propylenowy;
- **SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO:** preparat stosujemy zarówno na podłożach jak i w pomieszczeniach gdzie odbywa się tucz trzody. Przy stosowaniu AGRISAN 8090 szczególną uwagę w na najbardziej zawilgocone części kojca: miejsca oddawania odchodów, wody. Produkt może być stosowany także na głęboką ściółkę. Preparat nanosi się na powierzchnię lub na ściółkę 1-2 razy w tygodniu przez równomierne posypywanie. Optimalna dawka 100 g/1 m². Służy do dezynfekcji budynków inwentarskich w obecności zwierząt;

VIRKON™ S

- **POSTAĆ:** proszek, produkt o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni, narzędzi i wyposażenia gospodarstwa, dezynfekcji sprzętu;
- **OPAKOWANIE:** saszetka w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla w opakowaniu zbiorczym (karton); wiadro (polipropylen);
- **SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO:** Skuteczny na powierzchniach przy temperaturach +4°C) w niskich stężeniach, krótkim czasie oddziaływania na patogen (1-2 godziny). Rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni: 1:100 (10 gramów środka Virkon™ S na 1 l wody). użyciu myjki ciśnieniowej lub innego opryskiwacza mechanicznego nanieść roztwór środka w dawce 300 ml/m².

Przygotowanie 1% roztworu: 150 g preparatu wraz z 15 l letniej wody wystarczy na 50 m²; 300 g z 30 l letniej wody wystarczy na 100 m²; 1,5 kg preparatu wraz z 150 l letniej wody wystarczy na 500 m²;

Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów: wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymyć, zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania. Stosować ciągle. Zaleca się przy wejściu na farmę produkcyjną i przy wejściu do budynków.

Zamgławianie/dezynfekcja za pomocą spryskiwania: stosować urządzenie ciśnieniowe plecakowy. Dozować 1 l roztworu na 10 m² powierzchni podłogi. Zamgławianie na zimno: za pomocą zamgławiacza mechanicznego dozować 1 l roztworu preparatu na 10 m² powierzchni podłogi.

DESAM EFEKT M

- **POSTAĆ:** Ciecz, środek myjąco-dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych oraz wirusobójczych, przeznaczony do stosowania do wszystkich części sprzętu w zakładach opieki zdrowotnej, w przemyśle spożywczym;

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

[Dokumentacja zrywania łańcucha zakażeń zoonozami w gospodarstwie](#)

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

Załącznik nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji					
Data zabiegu	rodzaj zabiegu:czyszczenie (C), dezynfekcja (D)/uzupełnienia środka dezynfekcyjnego (U)				Miejsce zabiegu
	Budynek nr (jeśli więcej niż 1)	sprzęt /narzędzia	Maty przed wjazdem/ wyjazdem z/do gospodarstwa*	Maty przed wejściem / wyjściem do budynku, w którym utrzymywane są świnię	
28.02.2018.	C,D	C,D		U	

* obowiązek wyłożenia mat na wjeździe/wyjeździe do/z gospodarstwa nie dotyczy terytorium Polski znajdujących się w granicach państwa

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

Wzrost i rozwój

Numer siedziby stada: PL.....

[illegible]

*) wymóg sporządzenia spisu oraz bieżące aktualizowanie tego spisu wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Spis ten nie jest tożsamy ze spisem składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**) spis po raz pierwszy powinien zostać sporządzony w dniu 28 lutego 2018 r. Spis aktualizuje się w przypadku danym gospodarstwie, np. w przypadku zdarzeń typu: kupno, sprzedaż, padnięcie świń, ubój w gospodarstwie odsadzone i będzie określone jako warchlak, czy też warchlak ukończy 10 tydzień życia i będzie określany jako

~~Pobierz plik w formacie PDF~~

Ulotka informacyjna na temat **wymogów** dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, utrzymywane są świnie, **wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).**

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski **poza obszarami objętymi restrykcjami** w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochroną).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających do gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i dezynfekowanie obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, oraz stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

Ważne daty:

Od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia wymagań.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowy lekarz weterynarii:

- 1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne o usunięciu uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;
lub
- 2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością zabicia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
- 3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
- 4) za ubite lub zabite świnie **nie przysługuje odszkodowanie** ze środków budżetu państwa;
- 5) nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza, wykaze, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świń przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

1. za każdą świnie, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!

Afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku.

To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?

U zwierząt występują gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyspieszony oddech, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą

Informacje i materiały ASF

Wprowadził(a) lek. wet. Jacek Pilarski

niedziela, 18 marca 2018 00:00 - Data ostatniej modyfikacji niedziela, 18 marca 2018 21:45

